SCHEDA PER IL PAZIENTE

Apixaban ABDI (apixaban)

Scheda per il Paziente

Lei/il bambino/il caregiver deve tenere sempre con sé questa scheda

Mostri questa scheda al farmacista, al dentista ed a qualsiasi altro operatore sanitario prima del trattamento.

Sono in trattamento anticoagulante con Apixaban ABDI (apixaban) per prevenire la formazione di coaguli di sangue

Completi cortesemente questa sezione o chieda al medico di farlo
Nome:
Data di nascita:
Indicazione:
Peso:
Dose: mg due volte al giorno
Nome del medico:
Numero di telefono del medico:

Informazioni per i pazienti/caregiver
- Prenda/Dia Apixaban ABDI regolarmente secondo le istruzioni. Se dimentica di prendere/dare una dose mattutina, la prenda/dia non appena se ne ricorda, può prenderla/darla insieme alla dose serale. Una dose serale dimenticata può essere presa/data solo nella stessa sera. Non prenda/dia due dosi il mattino successivo, e poi continui invece a seguire il suo schema di somministrazione due volte al giorno, come raccomandato, il giorno successivo.
- Non interrompa l'assunzione/la somministrazione di Apixaban ABDI senza parlarne prima con il medico, perché lei/il paziente è a rischio di andare incontro ad un ictus/coagulo di sangue o ad altre complicazioni.
- Apixaban ABDI aiuta a fluidificare il sangue. Tuttavia, questo può aumentare il rischio di sanguinamento.
- Segni e sintomi di sanguinamento includono lividi o sanguinamento sotto pelle, feci color catrame, sangue nelle urine, sangue dal naso, capogiri, stanchezza, pallore o debolezza, mal di testa improvviso severo, tosse con sangue o sangue nel vomito.
- In caso di sanguinamento che non si fermi da solo, **richieda immediatamente assistenza medica.**
- Se lei/il paziente deve sottoporsi ad un intervento chirurgico o qualsiasi procedura invasiva, informi il medico che lei/il paziente sta assumendo Apixaban ABDI.

Informazioni per gli operatori sanitari
- Apixaban ABDI (apixaban) è un anticoagulante orale che agisce attraverso un'inibizione diretta selettiva del fattore Xa.
- Apixaban ABDI può aumentare il rischio di sanguinamento. In caso di eventi di sanguinamento maggiore, Apixaban ABDI deve essere interrotto immediatamente.
- Il trattamento con Apixaban ABDI non richiede un monitoraggio di routine del livello di esposizione. Un dosaggio quantitativo calibrato del fattore anti-FXa può essere utile in circostanze eccezionali, come ad esempio, sovradosaggio e chirurgia d'urgenza (test di coagulazione quali, tempo di protrombina (PT), rapporto internazionale normalizzato (INR) e tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) non sono raccomandati) - vedere RCP.

- Per gli adulti è disponibile un antidoto che contrasta l'attività anti-fattore Xa di apixaban; tuttavia, la sua sicurezza ed efficacia non sono state stabilite nei pazienti pediatrici (vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di andexanet alfa).